

# Памятка для пациента при неонкологических показаниях

## Памятка для пациента, получающего лекарственный препарат (ЛП) Ацеллбия® (ритуксимаб) по неонкологическим показаниям

### Почему мне дали эту карточку-памятку?

ЛП, которое Вы получаете, может повысить вероятность заражения инфекцией. В этой памятке описано:

- Что Вам необходимо узнать перед применением ЛП Ацеллбия®
- Каковы признаки инфекции
- Что делать, если Вы думаете, что у Вас возникла инфекция

На обратной стороне карточки-памятки также указано Ваше имя, имя и телефонный номер Вашего врача.

### Что мне необходимо делать с этой карточкой-памяткой?

- Всегда держите карточку-памятку при себе, например, в кошельке или сумке.
- Покажите эту карточку-памятку любому врачу, медсестре или стоматологу, которого Вы посещаете, а не только специалисту, который выписал Вам ЛП Ацеллбия®.

Храните при себе карточку-памятку пациента на протяжении 2 лет после введения последней дозы ЛП Ацеллбия®. Это связано с тем, что в течение некоторого времени после приема ЛП возможно развитие нежелательных реакций.

### Когда мне не следует принимать ЛП Ацеллбия®?

Не принимайте ЛП Ацеллбия®, если у Вас имеется активная инфекция или серьезная проблема с иммунной системой.

Расскажите вашему врачу или медсестре, если ранее Вы

### Что еще я должен знать?

В редких случаях ритуксимаб (ЛП Ацеллбия®) может вызвать серьезную инфекцию головного мозга, которая называется «прогрессирующая многоочаговая лейкоэнцефалопатия» (ПМЛ). Она может привести к смертельному исходу.

Признаки ПМЛ включают:

- Спутанность сознания, потерю памяти или проблемы с мышлением.
- Потерю равновесия или изменение походки или речи.
- Снижение силы или слабость в одной стороне тела.
- Нарушение четкости зрения или потерю зрения.

### Что еще я должен сделать?

принимали лекарственные средства, которые могут повлиять на Вашу иммунную систему, включая препараты химиотерапии.

### **Каковы признаки заражения инфекцией?**

Следующие признаки указывают на возможную инфекцию:

- Повышенная температура или кашель.
- Снижение веса.
- Появление боли при отсутствии травмы.
- Общее плохое самочувствие или слабость.
- Жжение и/или боль при мочеиспускании.

Если Вы наблюдаете один из вышеперечисленных признаков, немедленно сообщите врачу или медсестре. Вы также должны сообщить, что принимаете ЛП Ацеллбия®.

### **Где я могу получить более подробную информацию?**

Необходимо ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению ЛП Ацеллбия®.

### **Даты введения ЛП и контактная информация**

Дата последней инфузии:

\_\_\_\_\_

Дата первой инфузии:

\_\_\_\_\_

ФИО пациента:

\_\_\_\_\_

ФИО врача:

\_\_\_\_\_

Контактная информация врача:

\_\_\_\_\_

К посещению врача подготовьте список всех лекарственных средств, которые Вы принимаете в настоящее время. Обратитесь к Вашему врачу или медсестре, если у Вас возникли вопросы по поводу информации в этой карточке-памятке.

Если у Вас появились нежелательные реакции, связанные с получением ЛП Ацеллбия®, сообщите об этом лечащему врачу. Так же можно передать эту информацию в любом удобном способом:

- по электронной почте:  
safety@biocad.ru
- по почте: 198515, Санкт-Петербург, п. Стрельна, ул. Связи., 34-А
- по факсу с пометкой «фармаконадзор»: 8-812-380-49-33 доб. 8639
- по телефону: 8-812-380-49-33
- заполнить онлайн форму на сайте <https://biocad.ru/farmakonadzor>